

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problems Mailbox.**

JA 0039601

028 1983

000-1-1-1

JA -1983-03

0039601

K15 ELECTRIC IND KK 03.09.81-JP-159:34 (03.03.83) A01n-25/10	A97 C03 03.09.81-JP-159:34 (03.03.83) A01n-25/10	NITL 03.09.81 *J58039-601	A(12-W4) C(2-G, 2-K, 2-O, 6-D3, 6-D5, 7-D13, 7-E3, 12-A1, 12-A2, 12-M11) 9
Compound for controlling tree diseases - comprises mixt. of [redacted]			DETAILS The active component is formulated as tablet or stick together with hydrophilic polymer and thus obtained preparation is inserted in a hole provided on the trunk. As hydrophilic polymer there are used those which [redacted]
C83-053197 Device for administering tree disease controlling agent comprises a mixture of 10-60 wt. % of [redacted] consisting of one or more components selected from captan, benlate, thiophentazole, bixide, kasugamycin, griseofulvin and polyoxin, and 90-10 wt. % of hydrophilic polymer, [redacted]			The preparation is inserted in the hole and [redacted] the active component is slowly dissolved in water which is absorbed from the trunk. If desired, there can be added dropwise excipients such as tobacco powder, wood flour, clay, talc, silica, etc. The size of the device is 5-10 mm diameter and 40-80 mm long (JPW-108).
USE/ADVANTAGES The device is effective in the treatment and prevention of [redacted] particularly blight of cedar. The device administers the active component to trunk of tree slowly. The device is effective in the control of tree diseases caused by Uncinula necator, U. aceris, Perisporiaceae, Ceratocystis sp., etc. [redacted]			J58039601

424-411

①

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭58-39601

⑤ Int. Cl.<sup>3</sup>  
A 01 N 25/10

識別記号

庁内整理番号  
7442-4H

⑬ 公開 昭和58年(1983)3月8日

発明の数 1  
審査請求 有

(全 3 頁)

⑭ 樹木病治療剤投与デバイス

茨木市下穂積1丁目1番2号日  
東電気工業株式会社内

⑯ 特 願 昭56-139434

⑰ 発 明 者 石田義枝

⑱ 出 願 昭56(1981)9月3日

茨木市下穂積1丁目1番2号日

⑲ 発 明 者 牛山敬一

東電気工業株式会社内

茨木市下穂積1丁目1番2号日

⑳ 出 願 人 日東電気工業株式会社

東電気工業株式会社内

茨木市下穂積1丁目1番2号

㉑ 発 明 者 宮本芳則

㉒ 代 理 人 弁理士 牧野逸郎

明 細 書

1. 発明の名称

樹木病治療剤投与デバイス

2. 特許請求の範囲

(1) キヤブタン、グリオジン、ベンレート、チオベンダゾール、アミカル、バイオサイド、カスガマイシン、グリセオフルビン及びボリオキシソニルよりなる群から選ばれる少なくとも一種の抗微生物剤 10～60 重量%と樹木性重合体 90～40 重量%とからなり、棒状又は錠剤状に成形されていることを特徴とする樹木病治療剤投与デバイス。

(2) 樹木性重合体が酢酸ビニル含量 15 重量%以上のエチレン-酢酸ビニル共重合体であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の樹木病治療剤投与デバイス。

3. 発明の詳細な説明

本発明は樹木病治療剤投与デバイスに関し、詳しくは樹木病、特に松枯れに予防、治療効果を有する抗微生物剤を樹幹中に徐々に投与するための

デバイスに関する。

従来、樹木における病害虫を排除し、或いは殺虫するために産状又は粉状の殺虫剤を樹木に散布したり、また、殺虫剤を樹木の根元周辺の土中に散布したりしているが、このような方法では殺虫剤が降雨により速やかに流失して十分な効果を得ることができず、また、流失した殺虫剤が井戸水や上水道水源等に侵入し、環境汚染を招来するおそれがあるのみならず、樹木病の治療方法として本質的に不十分である。即ち、樹木病の多くは糸状菌類、例えばブドウ菌科 (Uromyces)、ケヤキ白接病菌 (u. aceris D.O. var Tulasnei Fuck) 等の Uromyces や、スス菌類 (Perisporiaceae)、例えば Cladosporium 属等の微生物によるものであり、Ceratocystis sp. による樹木病としてニレオランダ病 (O. almi) が挙げられ、特に松枯れは Ceratocystis sp. の感染によるものであることが判明してきている。従つて、従来の殺虫剤を用いる方法によつては樹木病を根本的に治療することはできない。

本発明者らは上記に鑑みて鋭意研究した結果、ある種の薬剤が樹木病、特に松枯れの原因となる菌生物に抗菌力を有すると共に、これらを親水性重合体に均一に混合することにより、薬剤が樹幹中に徐々に投与されることを見出して本発明に到つたものである。

本発明による樹木病治療剤投与デバイスは、キャプタン、グリオジン、ベンレート、チオペンダゾール、アミカル、バイオサイド、カスガマイシン、グリセオフルビン及びポリオキシンよりなる群から選ばれる少なくとも一種の抗菌生物剤10～60重量%と親水性重合体90～40重量%とからなり、棒状又は錠剤状に成形されていることを特徴とする。

本発明において用いる抗菌生物剤はキャプタン、グリオジン及びベンレートの菌殺、チオペンダゾール、アミカル及びバイオサイドの防カビ剤、カスガマイシン、グリセオフルビン及びポリオキシンの抗生物質の少なくとも一種であり、特にベンレート、アミカル及びポリオキシンが有効で

ある。これらの抗菌生物剤は粉末であり、一般的には樹幹中に徐々に投与し、吸収させることは困難であるが、本発明に従つて、これら抗菌生物剤を親水性重合体と共に成形し、予め樹幹に穿設した孔に挿入することにより、適度の速度で樹幹中に投与することができる。ここに親水性重合体は自己の体積の2倍以上の水を吸つて膨潤する重合体が好ましく、特に酢酸ビニル含量が15重量%以上のエチレン-酢酸ビニル共重合体が、その適度の親水性から好ましい。上記した抗菌生物剤は、親水性重合体が樹幹から吸水した水に徐々に溶解し、重合体から樹幹中に徐々に放出され、抗菌力を発現して、一般に樹木病、特に松枯れを長期にわたつて有効に予防、治療する。また、上記エチレン-酢酸ビニル共重合体は、松の樹幹の樹脂中に含まれるテルペノイドに徐々に溶解し、これに伴つて抗菌生物剤も樹幹中に徐々に放出され、導水管中に溶解し、松枯れを防止する。

抗菌生物剤は親水性重合体90～40重量%に対して10～60重量%用いるのが適当である。

重合体に対して抗菌生物剤が余りに少ないときは治療効果が十分でなく、一方、余りに多いときは成形物への成形が困難となるからである。

本発明のデバイスは特に制限されないが、抗菌生物剤を加熱溶解した重合体と混練し、押出成形、圧縮成形等により棒状又は錠剤状に成形することにより得られる。必要ならば、増量剤を用いてもよい。増量剤は、抗菌生物剤を重合体と共に成形する際の成形性を阻害しない範囲で用いられ、通常、重合体100重量部当たり20重量部以下が適当である。増量剤としては例えばクレーン粉、タピオカ粉、木粉、クレーン、タルク、シリカ等公知のものを用いることができる。尚、棒状の成形物とは、横断面が長さ全体にわたつて一様である円柱、角柱のほか、先端を円錐状、卵頭状、角錐状とした円柱、角柱、更には、横断面を先端方向に漸次小さくした先端細い円柱、角柱及びこれらの組合せを含む。また、錠剤状の成形物には球状、棒状球のほか、扁平な円盤状を含む。

本発明のデバイスの大きさは適当に選ばれるが、

棒状成形物の場合、通常、直径5～10mm、長さ10～80mm程度であり、錠剤状成形物の場合、例えば厚さ3～10mm、直径10～20mm程度が適当である。

本発明による治療剤投与デバイスの使用に当つては、通常、樹木の樹幹根元付近に成形物の大きさに応じて孔を通径調整ドリルで穿設し、この孔にデバイスを挿入する。親水性樹脂が吸水し、この水分に抗菌生物剤が溶解し、成形物から樹幹中に徐々に投与されて、抗菌力を発現する。

以下に本発明の実施例を挙げると、本発明はこれらに限定されるものではない。

#### 実施例

抗菌生物剤ベンレート又はポリオキシンを加熱溶解したエチレン-酢酸ビニル共重合体にロール圧縮し、ペレツト化した後、直径5mmの棒状に押出成形し、長さ30mmに切断してデバイス1～5を製作した。各デバイスにおける抗菌生物含有量、重合体における酢酸ビニル含量を表1表に示す。また、デバイス6は、アミカル48を重合体と

浸漬後、80℃の熱プレスで5mm厚のシートに成形し、これをポンチで打抜いて直径10mmの錠剤としたものである。

第 1 表

デバイス 番 号	抗菌生物剤含量 (重量%)	共重合体の酢酸ビニル 含量 (重量%)
1	ベンレート (10)	19
2	ベンレート (10)	28
3	ベンレート (10)	40
4	ベンレート (20)	40
5	ポリオキシシンB (10)	19
6	アイカル48 (10)	40

上記各デバイスを100mlの蒸留水に浸漬し、30℃の温度で静置し、24時間ごとに蒸留水を新しく交換して、デバイス1個当たりについて放出された抗菌生物剤の量を測定した。結果を第1図に示すように、抗菌生物剤は長期にわたって蒸留水中に検出されることが確認された。

次に、デバイスを小片に切断し、*Aspergillus*

特開258-39601(3)

*niger*, *Penicillium flavas* 及び *Ceratocystis sp.*

の各菌体懸濁液を加えたサブロー培地平板上に設置し、30℃で72時間培養した結果、第2表に示す生育阻止円が得られ、これら菌体に対して有効な抗菌力を有することが確認された。

第 2 表

デバイス (体積ml)	生育阻止円径 (mm)		
	<i>Asp.</i> <i>niger</i>	<i>P. flavas</i>	<i>Cerato.</i> <i>sp.</i>
1 (1×1×1)	38	45	72
5 (5×5×2)	46	52	33
6 (5×5×2)	36	28	25

また、6本のデバイス4を直径約20cm、高さ約6m(約100f)の松の樹幹根元付近に挿入し、地上高さ約2mの位置の枝先の新芽を逐日的に採取し、この新芽の小片を *Ceratocystis sp.* の菌体懸濁液を加えたサブロー平板培地に設置し、30℃で72時間培養した。この結果、第2図に示す生育阻止円が得られ、松枯れを長期間にわたって


有効に防止し得ることが確認された。

#### 4. 図面の簡単な説明


第1図は本発明のデバイスを蒸留水に浸漬したときの抗菌生物剤の検出を示すグラフ、第2図は本発明のデバイスを適用した松新芽についての *Ceratocystis sp.* の経時的な生育阻止円径を示すグラフである。

特許出願人 日東電気工業株式会社  
代理人 弁護士 牧野 逸 郎

第1図



第2図



POWERED BY **Dialog**

**Compsn. for controlling tree diseases - comprises mixt. of antibacterial and hydrophilic polymer formulated as tablet or stick**

**Patent Assignee: NITTO ELECTRIC IND CO**

**Patent Family**

Patent Number	Kind	Date	Application Number	Kind	Date	Week	Type
JP 58039601	A	19830308				198315	B

**Priority Applications (Number Kind Date): JP 81139434 A ( 19810903)**

**Patent Details**

Patent	Kind	Language	Page	Main IPC	Filing Notes
JP 58039601	A		3		

**Abstract:**

JP 58039601 A

Compsn. comprises a mixt. of 10-60 wt.% antibacterial agent consisting of at least one of Captan, Benlate, Thiopentazole, Bioxide, Kasugamycin, Griseofulvin and Polyoxin, and 90-40 wt.% hydrophilic polymer. The mixture is formulated as stick or tablet.

The device is effective in treatment and prevention of tree disease, partic. blight of cedar. The device administers the active component to trunk of tree slowly. The device is effective in the control of tree diseases caused by Uncinula necator, u. aceris, Perisporiaceae, Ceratocystis sp., etc. The active component can be supplied slowly to the trunk by mixing with hydrophilic polymer.

Derwent World Patents Index

© 2002 Derwent Information Ltd. All rights reserved.

Dialog® File Number 351 Accession Number 3676040